

# Le bégaiement chez les enfants d'âge préscolaire



## L'origine

La cause du bégaiement est très complexe. Chez la plupart des enfants, il s'explique par un traitement différent de la parole dans le cerveau et par des facteurs génétiques.



## Caractéristiques

Les caractéristiques visibles du bégaiement sont les répétitions de sons ou de mots et le fait d'être bloqué pendant ou juste avant un son. Le bégaiement peut également avoir un impact sur le fonctionnement social et émotionnel. Parfois, les enfants présentent des comportements secondaires tels que cligner des yeux, ce qui indique qu'ils luttent contre le bégaiement.



## Quelle est la fréquence pour parler de bégaiement?

Lorsqu'il y a une présence accrue des disfluences anormales, il est adéquat de parler de bégaiement.



## Comment peut-on aider un enfant qui bégaié?

- Prenez le temps pour la conversation.
- Restez relaxé et regardez l'enfant pendant que vous écoutez.
- Attendez votre tour pour parler et n'interrompez pas l'enfant.
- Répondez à ce que l'enfant dit et non à la façon dont il parle.



## Parler du bégaiement avec l'enfant

Il est important que l'enfant et son entourage reconnaissent leurs pensées et leurs sentiments et discutent du bégaiement. Même les jeunes enfants sont souvent déjà conscients de leur bégaiement. Le fait d'en parler permettra à l'enfant de moins s'inquiéter. Demandez des conseils concrets à un logopède spécialisé dans le bégaiement.



## Orienter

Vous pensez qu'un enfant bégaié? N'attendez pas avant d'agir. Il est préférable que les parents prennent contact avec un logopède spécialisé en bégaiement. Avec les bons conseils ou la bonne prise en charge, les chances de rétablissement avant l'âge de six ans sont plus grandes.



Informations supplémentaires

<https://www.thomasmore.be/stotteren-bij-kleuters>

THOMAS  
MORE



Rechercheurs & auteurs: Diede Piedfort, Steffi Snijders, Renke Sevenants, Kurt Eggers & Sabine Van Eerdenbrugh